



La **mission** principale del programma di screening del cervicocarcinoma è quella di **ridurre l'incidenza del tumore e la mortalità specifica**.

Caratteristiche dell'intervento sono:


- ✚ la **gratuità** i test 1° e 2° livello screening sono gratuiti per donne eleggibili invitate attivamente e residenti nella ASL Lanciano-Vasto-Chieti e non richiedono impegnativa
- ✚ l' **equità**: il test 1° livello è offerto anche a tutte le donne eleggibili interessate che possono richiedere di essere invitate rivolgendosi al Centro Invito Provinciale dell'Unità Operativa di Citodiagnostica di Lanciano
- ✚ la **qualità**: il processamento dei test viene eseguito con sistemi automatici innovativi, tutte le fasi dello screening sono soggette a controllo di qualità e viene garantita la formazione continua degli operatori.

Tumore al collo dell'utero: come si sviluppa?

È il primo tumore che l'OMS riconosce come sicuramente causato da un'infezione dovuta al Papilloma virus e che in alcuni casi provoca lesioni da cui si può sviluppare negli anni un tumore. Tra i fattori di rischio da tener presenti ci sono l'inizio precoce dell'attività sessuale partner multipli e basse difese immunitarie.

Che cosa è il Papilloma Virus Umano(HPV)?

È una famiglia di virus che comprende più di 120 ceppi che possono infettare l'uomo. Tra questi 40 ceppi provocano infezioni dell'apparato genitale (principalmente collo dell'utero e vagina) ma soltanto 12, secondo lo IARC 2011, possono causare il tumore del collo dell'utero. Il virus è così comune che si stima che la maggior parte degli uomini e delle donne ne siano venuti in contatto nel corso della vita e che quindi siano o sono stati portatori del virus in modo inconsapevole.



Come si trasmette l'infezione da HPV?

E' la più comune delle infezioni a trasmissione sessuale, ma i Papilloma Virus si possono trasmettere anche con rapporti sessuali non completi compresi i contatti orogenitali.

L'infezione può essere individuata anche molti anni dopo averla contratta.

Quindi il fatto di avere l'infezione può non avere nulla a che fare con l'attuale compagno, ma con un partner precedente

Quanto tempo dura l'infezione?

Recenti studi hanno dimostrato che l'infezione da HPV aumenta fino a 25 anni di età per poi regredire spontaneamente nell'80% delle donne entro 18 mesi. Dopo i 30 anni è stato dimostrato che se l'infezione persiste **nel tempo** tende **negli anni** a progredire e può provocare lesioni cellulari pretumorali. Per questi motivi lo screening con test HPV non deve iniziare prima dei 30 anni e sotto questa età è raccomandato lo screening citologico. Essendo inoltre il test HPV molto efficace nell'individuare la presenza del virus è consigliato fare un nuovo test HPV di screening dopo 5 anni

Gli strumenti per difendersi: potenza della prevenzione

Il tumore che si sviluppa nella parte inferiore dell'utero, chiamata cervice, è sempre preceduto da alterazioni cellulari che è possibile riconoscere prima che possano degenerare. L'incidenza del tumore e la conseguente mortalità possono essere dunque efficacemente contrastate partecipando al Programma di screening del cervico-carcinoma. Si tratta di una campagna per la prevenzione e la diagnosi precoce dei tumori del collo dell'utero attraverso un esame semplice e non doloroso.

Come è organizzato lo Screening oncologico?

Due differenti tipi di esami a seconda dell'età:

- un Pap test, da ripetere ogni tre anni, per le donne in età compresa tra 25 e 29 anni
- un test per la ricerca del Papilloma virus umano, da ripetere ogni cinque anni, per le donne in età compresa tra 30 e 64 anni

Il test e gli eventuali accertamenti di approfondimento che si rendessero necessari sono gratuiti e non richiedono l'impegnativa del medico.

Sono escluse definitivamente dall'Invito Attivo Screening:

- *le donne che hanno meno di 25 anni e che hanno superato i 64 anni ma con ultimo test negativo*
- *le donne che hanno subito un intervento di asportazione dell'utero (isterectomia totale)*
- *le donne in cura per una patologia tumorale in atto alla cervice uterina*
- *le donne trasferite in altra provincia*

Sono escluse temporaneamente dall'Invito Attivo Screening:

- *le donne che hanno effettuato un test opportunistico fuori dal programma di screening (Decreto Commissariale del Commissario ad ACTA n° 112 del 28/09/2016)*
- *le donne in cura per lesioni preneoplastiche in atto della cervice uterina e le donne che hanno subito un intervento di conizzazione (follow up oncologico attivo presso gli ambulatori di Colposcopia Screening - viene seguito il percorso indicato dalle Linee Guida Regionali)*
- *le donne che non sono disponibili temporaneamente a collaborare (particolari condizioni personali familiari)*
- *le donne residenti altrove per un periodo temporaneo ma prolungato*