

## COS'E' LO SCREENING DEL CERVICO-CARCINOMA ED A CHI SI RIVOLGE



<b>A chi si rivolge</b>	Alla popolazione femminile della ASL Lanciano-Vasto-Chieti di età compresa tra 25 e 64 anni
<b>Invito attivo</b>	Mediante lettera personalizzata spedita a domicilio dal Centro Invito Screening Provinciale Unità Operativa di Screening del cervico-carcinoma e Citodiagnostica
<b>Test di screening 1° livello</b>	<u>Test HR HPV DNA</u> , ricerca del Papilloma Virus ad alto rischio oncogeno, per le donne in età compresa tra <u>30 e 64 anni</u> <u>Pap test</u> per le donne di età compresa tra <u>25 e 29 anni</u>
<b>Frequenza dell'esame in caso di negatività del test 1° livello</b>	<u>5 anni</u> per il Test HR HPV DNA <u>3 anni</u> per il Pap test
<b>Test di triage in seguito ad un test Primario Positivo</b>	<u>Pap test su strato sottile</u> in caso di positività del test HR HPV <u>Test HR HPV DNA</u> in caso di ASCUS/AGC da Pap Test
<b>Frequenza dell'esame in caso di positività del test 1° livello HR HPV</b>	<u>Ripetizione test HPV ad 1 anno</u> se la citologia di triage è negativa <u>Invio diretto in colposcopia</u> se la citologia è ASCUS+ o INADEGUATA <u>Invio in colposcopia</u> delle donne con persistenza della positività al test HPV dopo ripetizione ad 1 anno del test HPV con citologia negativa
<b>Frequenza dell'esame in caso di positività del test 1° livello PAP TEST</b>	<u>Rientro nello screening</u> se la citologia è ASCUS/AGC ma con test HPV negativo <u>Invio in colposcopia</u> se la citologia è ASCUS/AGC ma il test di triage HPV è positivo. L'AGC viene inviato in colposcopia anche se il test HPV di triage è negativo <u>Invio diretto in colposcopia</u> se il pap test è LSIL+
<b>Rientro nello screening</b>	Dopo negatività del test HR HPV DNA e/o del pap test