

SOFFOCAMENTO DA CORPO ESTRANEO: COSA FARE NEL LATTANTE

TOSSISCE, PIANGE O EMETTE SUONI?
ALLORA HA UN'OSTRUZIONE PARZIALE

NON ESEGUIRE MANOVRE DI DISOSTRUZIONE!
Incoraggiarlo a tossire
Controlla che la situazione non peggiori.

**NON TOSSISCE, NON PIANGE, NON RESPIRA
(OSTRUZIONE COMPLETA)
MA SI MUOVE, REAGISCE: È COSCIENTE**



1 5 PACCHE DORSALI

Posiziona il lattante a pancia in giù sull'avambraccio, sostieni la testa mantenendola più in basso del tronco ed esegui 5 pacche tra le scapole.



2 5 SPINTE TORACICHE

Girato a pancia in su sostenendo la testa più in basso del tronco. Esegui 5 spinte sul torace con la parte inferiore del palmo della mano.

3 CONTINUA: 5+5

Alterna 5 pacche dorsali + 5 spinte toraciche finché il corpo estraneo viene espulso o il lattante perde coscienza.



ATTENZIONE

- non infilare le dita in bocca per cercare il corpo estraneo
- rimuovilo solo se ben visibile

**NON TOSSISCE, NON PIANGE, NON RESPIRA
(OSTRUZIONE COMPLETA)
NON SI MUOVE, NON REAGISCE: È INCOSCIENTE**



1 30 COMPRESSIONI TORACICHE

Posizionalo a pancia in su, su di un piano rigido e scopri il torace. Circonda il torace con entrambe le mani ED ESEGUI LE COMPRESSIONI CON DUE POLLICI.



2 2 VENTILAZIONI

Apri le vie aeree ed esegui 2 ventilazioni bocca-bocca/naso

3 CONTINUA 30:2

Alterna 30 compressioni toraciche e 2 ventilazioni bocca-bocca/naso fino all'arrivo dei soccorsi.

SEGUI SIMEUP SU:



Scansiona il QR

Scopri la sede
più vicina a te



Sostieni SIMEUP ETS

Aiutaci a diffondere la cultura
dell'emergenza pediatrica

